I DRIVER DI SCELTA DELL'APPROCCIO TERAPEUTICO ALLA CARENZA MARZIALE

6 MAGGIO 2021

WEBINAR 15:00-18:45

per iscriversi:

www.webinar-carenzamarziale.it/6maggio

PROGRAMMA

15:00 – 15:20	**INTRODUZIONE DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO**	R. Di Turi A. Lacquaniti P. Monardo
15:20 – 16:00	**LAVORI DI GRUPPO – PRIMA PARTE** Journal club: perché è importante trattare il deficit di ferro?	R. Di Turi A. Lacquaniti P. Monardo
16:00 – 16:40	**PRESENTAZIONE DEI LAVORI DI GRUPPO**	R. Di Turi A. Lacquaniti P. Monardo
16:40 – 17:20	**LAVORI DI GRUPPO – SECONDA PARTE** Journal club: quali sono i target clinici da considerare e perché?	R. Di Turi A. Lacquaniti P. Monardo
17:20 – 18:00	**PRESENTAZIONE DEI LAVORI DI GRUPPO**	R. Di Turi A. Lacquaniti P. Monardo
18:00 – 18:45	**DISCUSSIONE: QUALI DIFFERENZE TRA LA LETTERATURA E LA PRATICA CLINICA?**	R. Di Turi A. Lacquaniti P. Monardo

FACULTY

ROBERTA DI TURI
Dipartimento dei Servizi e UOC Farmacia Ospedaliera - ASL Roma 3

ANTONIO LACQUANITI
Dirigente UOC di Nefrologia e Dialisi del P.O. Papardo, Messina

PAOLO MONARDO
Direttore UOC di Nefrologia e Dialisi del P.O. Papardo, Messina

OBIETTIVI

- Fornire alle figure sanitarie, formazione e confronto sulla malattia renale cronica, in dialisi e pre-dialisi
- Condividere le ultime evidenze scientifiche sulla gestione della carenza di ferro nei pazienti in dialisi e nei pazienti non dializzati con malattia renale cronica
- Aumentare le conoscenze delle Good Clinical Practice nel trattamento della carenza marziale

Rif. ECM n°: 256 317406 Ed. 1 - **Partecipanti:** 25 - **Crediti assegnati:** 6
Target: 25 Medici *specialisti in:* Nefrologia, Medicina Interna, Cardiologia; Farmacisti (Territoriali e Ospedalieri) ed Infermieri

RAZIONALE

La carenza di ferro (ID) è definita come una "condizione in cui la disponibilità di ferro è insufficiente per soddisfare i bisogni dell'organismo e che può esser presente con o senza anemia". Nell'ID le riserve di ferro si esauriscono progressivamente prima che la morfologia dei globuli rossi e i livelli di emoglobina cambino. I pazienti possono manifestare sintomi precoci come affaticamento, riduzione delle prestazioni cognitive e intolleranza all'esercizio fisico. Oggigiorno, la diagnosi e il trattamento della carenza di ferro sono sempre più una sfida perché i marcatori del ferro possono essere influenzati da un'infiammazione di basso grado presente in condizioni comuni, come la malattia renale cronica, la cirrosi o l'insufficienza cardiaca. Ancora oggi non esiste un approccio omogeneo e condiviso con i farmacisti dal punto di vista farmacologico e farmacoeconomico sulla presa in carico dei pazienti con nefropatia cronica in dialisi. Questo corso si pone l'obiettivo, attraverso la disamina di alcuni lavori scientifici, di contestualizzare i punti fermi delle good clinical practice nel trattamento della carenza marziale con e senza anemia in questo setting di pazienti.

medical net
Provider ECM n. 256
Via Ravenna 9/c - 00161 ROMA
Tel. (+39) 06 8339 3669 - Fax (+39) 06 8928 3835
www.medical-net.it

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI VIFOR PHARMA